

1. Bezeichnung des Arzneimittels Silicium Gel F Wirkstoff: Kieselsäuregel mit gefälltem, disperskolloidalem Siliciumdioxid 2. Verschreibungsstatus/ Apothekenpflicht Freiverkäuflich 3. Zusammensetzung des Arzneimittels 3.1 Stoff- oder Indikationsgruppe Traditionelles Arzneimittel 3.2 Arzneilich wirksamer Bestandteil 100 ml Gel enthalten: 100 ml Kieselsäuregel mit 2,8 g gefälltem, disperskolloidalem Kieselsäureanhydrid (Siliciumdioxid) 3.3 Sonstige Bestandteile Keine 4. Anwendungsgebiete Traditionell angewendet: - innerlich zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, zur Kräftigung des Bindegewebes, - äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass er beim Auftreten von Krankheitszeichen einen Arzt aufsuchen soll. 5. Gegenanzeigen Keine bekannt 6. Nebenwirkungen Es wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet. 7. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln Keine bekannt	8. Warnhinweise Keine 9. Wichtigste Inkompatibilitäten Keine bekannt 10. Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben <i>Innerlich zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren und zur Kräftigung des Bindegewebes:</i> Täglich 1 [Messvorrichtung] (15 ml) mit Wasser oder Mineralwasser verdünnt zwischen den Mahlzeiten einnehmen. <i>Äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut:</i> Die betroffenen Stellen mit Silicium Gel F betupfen oder 1:4 mit Wasser verdünnt aufbringen und eventuell mit einem feuchten Gazestreifen überdecken. Die Anwendung mehrmals wiederholen. 11. Art und Dauer der Anwendung Siehe 10. Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete sowie Anwendungsfehler und Überdosierung. Anwendungsfehler und Überdosierung Bei langfristiger und hochdosierter Einnahme siliciumdioxidhaltiger Präparate ist sehr selten die Bildung von siliciumhaltigen Nierensteinen möglich. 12. Notfallmaßnahmen, Symptome und Gegenmittel Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt. 13. Pharmakologische und toxikologische Eigenschaften, Pharmakokinetik, Bioverfügbarkeit, soweit diese Angaben für die therapeutische Verwendung erforderlich sind 13.1 Pharmakologische Eigenschaften „Die Anwendung des Arzneimittels erfolgt ausschließlich auf der	Basis von Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Ergebnisse pharmakologischer und toxikologischer Versuche oder Ergebnisse klinischer Prüfungen mit Silicium Gel F liegen nicht vor.“ 13.2 Toxikologische Eigenschaften Siehe 13.1. 13.3 Pharmakokinetik Es liegen keine Daten vor. 13.4 Bioverfügbarkeit Es liegen keine Daten vor. 14. Sonstige Hinweise Aufgrund seiner adsorptiven Eigenschaften sollte Silicium Gel F nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden. 15. Dauer der Haltbarkeit Silicium Gel F ist 3 Jahre haltbar. Es sollte nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. 16. Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise Nicht über 25 ° C aufbewahren. Nach dem Öffnen der Flasche bitte im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch schütteln. 17. Darreichungsform und Packungsgrößen Originalpackung mit 200 ml bzw. 420 ml bzw. 500 ml Gel 18. Stand der Information ... / ... 19. Name oder Firma und Anschrift des/der pharmazeutischen Unternehmer(s) Zulassungsinhaber: GPK Gesundheitsprodukte GmbH Schloßstr. 11-17 79238 Ehrenkirchen Zul.-Nr. 6195044.00.00
---	--	---