

Gebrauchsinformation (Angaben auf dem Primärbehälter)

Aseptoman Duo Lösung zur Anwendung auf der Haut

Stoff- oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise:

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel.

Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (zusätzlich Adeno-, Noro- und Rotaviren).

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Gegenanzeigen:

Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Nicht auf Schleimhäuten oder im Augenbereich anwenden.

Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Bei Anwendung nicht rauchen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung:

Chirurgische Händedesinfektion:

Portionsweise 3 x 3 ml (gesamt 9 ml) Aseptoman Duo für 90 Sekunden in die trockenen Hände und Unterarme einreiben.

Hygienische Händedesinfektion und Virusinaktivierung:

3 ml Aseptoman Duo für 30 Sekunden auf den Händen verreiben.

Die Hände und Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feucht gehalten werden.

Zur Anwendung auf intakter Haut.

Nebenwirkungen:

Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch kontaktallergische Reaktionen sind möglich.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Verfalldatum:

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung und Beseitigung:

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Die Flasche fest verschlossen halten und vor Hitze geschützt aufbewahren!

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol.

Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung zur Anwendung auf der Haut. 150 ml, 500 ml, 1000 ml

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld

Tel.: +49-5664-9496-0

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: 10/2025

Zul.-Nr.: 2546.00.00

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

Entfällt.

INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

Nicht zutreffend.

INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

Nicht zutreffend.