**Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

**Ceftazidim Viatris 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung**
Ceftazidim

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**


1. Was ist Ceftazidim Viatris und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ceftazidim Viatris beachten?
3. Wie ist Ceftazidim Viatris anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ceftazidim Viatris aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen


## 1. Was ist Ceftazidim Viatris und wofür wird es angewendet?

Ceftazidim Viatris enthält den Wirkstoff Ceftazidim, ein Antibiotikum für Erwachsene, Jugendliche und Kinder (einschließlich Neugeborene). Es wirkt durch das Abtöten von Bakterien, die Infektionen verursachen. Ceftazidim gehört zur Arzneimittelgruppe der Cephalosporine.

Ceftazidim Viatris wird angewendet zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionen:
- der Lunge oder der unteren Atemwege
- der Lungen und Bronchien bei Patienten, die an zystischer Fibrose leiden
- des Gehirns (*Meningitis*)
- der Ohren
- der Harnwege
- der Haut und der Weichteilgewebe
- des Bauches und der Bauchwand (*Peritonitis*)
- der Knochen und Gelenke

Ceftazidim Viatris kann angewendet werden:
- zur Vorbeugung von Infektionen während Prostataoperationen bei Männern.
- zur Behandlung von Patienten mit niedriger Anzahl weißer Blutkörperchen (Neutropenie), die aufgrund einer bakteriellen Infektion Fieber haben.

Offizielle Richtlinien für den sachgemäßen Gebrauch von Antibiotika sollten berücksichtigt werden.

## 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ceftazidim Viatris beachten?

**Ceftazidim Viatris darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Ceftazidim, ein anderes Cephalosporin oder einen (der in Abschnitt 6 genannten) sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- wenn Sie eine schwere allergische Reaktion gegen ein anderes Antibiotikum (Penizillin, Monobactame und Carbapeneme) hatten, da Sie genauso gegen Ceftazidim allergisch sein können.

→ Informieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung mit Ceftazidim Viatris beginnen, wenn Sie glauben, dass dies auf Sie zutrifft. Ceftazidim Viatris darf Ihnen in diesem Fall nicht gegeben werden.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Ceftazidim Viatris anwenden.

Bei der Anwendung von Ceftazidim Viatris ist besondere Vorsicht geboten.

Sie müssen auf bestimmte Symptome wie allergische Reaktionen, Störungen des Nervensystems und Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie starke Durchfälle achten, solange Sie Ceftazidim Viatris anwenden. Dies wird das Risiko von möglichen Problemen senken. Siehe Abschnitt 4. „*Beschwerden, auf die Sie achten sollten*“. Wenn Sie im Vorfeld bereits eine allergische Reaktion auf ein anderes Antibiotikum gezeigt haben, können Sie auch auf Ceftazidim Viatris allergisch sein.

Schwere Hautreaktionen, einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom, toxisch epidermaler Nekrolyse, arzneimittelbedingter Reaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS) und akuter generalisierter exanthematischer Pustulose (AGEP), wurden im Zusammenhang mit der Anwendung von Ceftazidim berichtet. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie eines der in Abschnitt 4 beschriebenen Symptome im Zusammenhang mit diesen schweren Hautreaktionen bemerken.

Wenn bei Ihnen ein Blut- oder Harntest durchgeführt werden muss
Ceftazidim Viatris kann die Ergebnisse von Urinuntersuchungen auf Zucker und eine Blutuntersuchung, die als *Coombs-Test* bekannt ist, beeinflussen. Wenn bei Ihnen ein solcher Test durchgeführt wird:

→ Sagen Sie der Person, die die Probe nimmt, dass Sie Ceftazidim Viatris verabreicht bekommen haben.

**Anwendung zusammen mit anderen Arzneimitteln**
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Dies gilt auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.

Sie sollten Ceftazidim Viatris nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt erhalten, wenn Sie ebenfalls eines der folgenden Arzneimittel anwenden:
- ein Antibiotikum, das Chloramphenicol heißt.
- eine Gruppe von Antibiotika, die *Aminoglykoside* genannt werden, z. B. *Gentamicin* oder *Tobramycin*.
- Wassertabletten, die *Furosemid* heißen.

→ **Informieren Sie Ihren Arzt**, wenn dies auf Sie zutrifft.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Informieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ceftazidim Viatris verabreicht bekommen:
- wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, oder aber beabsichtigen, schwanger zu werden.
- wenn Sie stillen.

Ihr Arzt wird den Nutzen Ihrer Behandlung mit Ceftazidim Viatris gegen das Risiko für Ihr Baby abwägen.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Ceftazidim Viatris kann Nebenwirkungen hervorrufen, die die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen, wie z. B. Schwindel.

Fahren Sie kein Fahrzeug oder bedienen Sie keine Maschinen, solange Sie nicht wissen, ob Sie betroffen sind.

**Ceftazidim Viatris enthält Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält 102,4 mg Natrium (Hauptbestandteil von Koch- / Tafelsalz) pro Durchstechflasche. Dies entspricht 5,1 % der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.

**Ceftazidim Viatris enthält Natriumdisulfit**

Natriumdisulfit kann in seltenen Fällen schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und Bronchospasmen hervorrufen.

## 3. Wie ist Ceftazidim Viatris anzuwenden?

Ceftazidim Viatris wird normalerweise von einem Arzt oder anderem medizinischen Fachpersonal gegeben. Sie erhalten es:

- als Tropf (intravenöse Infusion) oder als Injektion direkt in eine Vene oder als tiefe intramuskuläre Injektion.

Ceftazidim Viatris wird vom Arzt, Apotheker oder medizinischen Fachpersonal zubereitet.

*Empfohlene Dosis*

Die für Sie geeignete Dosis von Ceftazidim Viatris wird von Ihrem Arzt festgelegt und ist abhängig von: der Schwere und Art der Infektion; davon, ob Sie irgendwelche anderen Antibiotika einnehmen; von Ihrem Alter und Gewicht sowie davon, wie gut Ihre Nieren arbeiten.

*Neugeborene Babys (0–2 Monate)*

Babys bekommen 25 bis 60 mg Ceftazidim Viatris pro kg Körpergewicht pro Tag, aufgeteilt auf zwei Einzelgaben.

*Säuglinge (ab 2 Monaten) und Kinder unter 40 kg Körpergewicht*

Säuglinge oder Kinder bekommen 100 bis 150 mg Ceftazidim Viatris pro kg Körpergewicht pro Tag verabreicht, aufgeteilt auf drei Einzelgaben. Die Höchstdosis beträgt 6 g pro Tag.

*Erwachsene und Jugendliche ab 40 kg Körpergewicht*

1 bis 2 g Ceftazidim Viatris dreimal täglich alle 8 Stunden. Die Höchstdosis beträgt 9 g pro Tag.

*Patienten ab 65 Jahren*

Die tägliche Dosis sollte normalerweise 3 g pro Tag nicht überschreiten, besonders, wenn Sie über 80 Jahre alt sind.

*Patienten mit Nierenproblemen*

Sie erhalten möglicherweise eine andere als die übliche Dosis. Der Arzt oder das medizinische Fachpersonal entscheidet je nach Schwere der Nierenerkrankung, wie viel Ceftazidim Viatris Sie benötigen. Ihr Arzt wird Sie genau untersuchen und bei Ihnen werden möglicherweise regelmäßigere Nierenfunktionstests durchgeführt.

Art der Anwendung
Ceftazidim Viatris sollte durch intravenöse Injektion/Infusion verabreicht werden. Ceftazidim Viatris-Lösungen können direkt in die Vene verabreicht werden, oder in den Schlauch des Infusionsbestecks eingebracht werden, wenn der Patient parenterale Flüssigkeiten erhält. Üblicherweise wird die intravenöse intermittierende Injektion oder kontinuierliche Infusion als Anwendungsart empfohlen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ceftazidim Viatris erhalten haben, als Sie sollten**
Wenn Sie versehentlich mehr als die verschriebene Dosis erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder das nächstgelegene Krankenhaus.

**Wenn Sie die Anwendung von Ceftazidim Viatris vergessen haben**
Wenn Sie eine Injektion versäumt haben, sollten Sie diese so bald wie möglich nachholen. Lassen Sie die versäumte Injektion jedoch aus, wenn es schon fast Zeit für die nächste Injektion ist. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis (zwei Injektionen zur selben Zeit) an, um die versäumte Dosis nachzuholen.

**Wenn Sie die Anwendung von Ceftazidim Viatris abbrechen**
Brechen Sie die Anwendung von Ceftazidim Viatris nicht ab, außer Ihr Arzt sagt es Ihnen.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken:
- Rötliche Flecken am Rumpf, diese Flecken sind Zielscheiben-ähnlich oder kerisrund, häufig mit Bläschenbildung im Zentrum, Abschälen der Haut, Geschwüre in Mund, Rachen, Nase, sowie im Genitalbereich und an den Augen. Diesen schweren Hautausschlägen können Fieber und grippeähnliche Symptome vorausgehen (Stevens-Johnson-Syndrom, toxisch epidermale Nekrolyse)
- Ausgedehnter Ausschlag, erhöhte Körpertemperatur und vegrößerte Lymphknoten (DRESS-Syndrom oder Arzneimittelüberempfindlichkeits-Syndrom)
- Ein roter, schuppiger, ausgedehnter Ausschlag mit Knötchen unter der Haut und Bläschen, begleitet von Fieber. Die Symptome treten üblicherweise zu Beginn der Behandlung auf (akute generalisierte exanthematische Pustulose).

Beschwerden, auf die Sie achten sollten
Die folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen sind bei einer geringen Anzahl Behandelter aufgetreten, die genaue Häufigkeit der Nebenwirkungen ist jedoch nicht bekannt:

- *Schwere allergische Reaktion.* Anzeichen dafür sind erhobener, juckender Ausschlag und Schwellung, manchmal des Gesichtes oder Mundes, die Atemnot verursachen kann.
- *Hautausschlag*, der zu Blasenbildung führen kann und der wie kleine Zielscheiben aussieht (in der Mitte gelegener dunkler Fleck, umgeben von einem blasseren Bereich, mit einem dunklen Ring rund um den Rand).
- *Großflächiger Ausschlag mit Blasen und sich schälender Haut.* (Dies können Anzeichen eines *Stevens-Johnson-Syndroms* oder einer *toxischen epidermalen Nekrolyse* sein.)

- *Erkrankungen des Nervensystems:* Zittern, Krampfanfälle und in manchen Fällen Koma. Dies trat bei Patienten auf, wenn die verabreichte Dosis zu hoch war, insbesondere bei Patienten mit Nierenerkrankungen.
- Grippeähnliche Symptome mit Ausschlag, Fieber, geschwollenen Lymphknoten und abweichenden Ergebnissen von Bluttests (darunter erhöhte Werte von weißen Blutkörperchen (Eosinophilie) und Leberenzymen) (Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS)).

→ *Wenden Sie sich sofort an einen Arzt oder das medizinische Fachpersonal, wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt.*

Häufige Nebenwirkungen
*Diese können bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen:*
- Durchfall
- Schwellung und Rötung entlang einer Vene
- erhobener roter Hautausschlag, der mit Juckreiz verbunden sein kann
- Schmerzen, Brennen, Schwellung oder Entzündung an der Injektionsstelle

→ **Informieren Sie Ihren Arzt**, wenn eine dieser Nebenwirkungen Sie beeinträchtigt.

*Häufige Nebenwirkungen, die bei Blutuntersuchungen auftreten können:*
- Erhöhung der Zahl einer bestimmten Art an weißen Blutkörperchen (Eosinophilie)
- Erhöhung der Anzahl an Zellen, die die Blutgerinnung fördern (Blutplättchen)
- Erhöhung der Leberenzyme

Gelegentliche Nebenwirkungen
*Diese können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen:*
- Entzündung des Darms, die Schmerzen oder Durchfall, welcher Blut enthalten kann, verursachen kann
- Candida-Pilzinfektionen im Mund oder in der Scheide
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Bauchschmerzen
- Übelkeit oder Erbrechen
- Fieber und Schüttelfrost

→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn eine dieser Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt.

Gelegentliche Nebenwirkungen, die bei Blutuntersuchungen auftreten können:
- Abnahme der Anzahl weißer Blutkörperchen
- Abnahme der Anzahl an Blutplättchen (Zellen, die die Blutgerinnung fördern)
- Anstieg des Harnstoffs, Harnstoff-Stickstoffes oder des Serumkreatinins im Blut

Sehr seltene Nebenwirkungen
*Diese können bis zu 1 von 10 000 Behandelten betreffen:*
- Nierenentzündung oder Nierenversagen.

Nicht bekannt
*Häufigkeit auf der Grundlage der vorhandenen Daten nicht abschätzbar.*
Andere Nebenwirkungen sind bei einer geringen Anzahl Behandelter aufgetreten, wobei ihre genaue Häufigkeit jedoch unbekannt ist:
- Kribbeln
- unangenehmer Geschmack im Mund
- Gelbfärbung der Haut oder des Weißen der Augen

Andere Nebenwirkungen, die bei Blutuntersuchungen auftreten können:
- rote Blutkörperchen werden zu schnell zerstört
- Erhöhung der Zahl einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen
- starke Abnahme der Anzahl weißer Blutkörperchen

**Meldung von Nebenwirkungen**
Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich feststellen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Ceftazidim Viatris aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Durchstechflasche und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern. Die Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen, Rekonstitution und Verdünnung
Die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen rekonstituierten Lösung wurde über 4 Stunden bei 25 °C und über 8 Stunden bei 2–8 °C nachgewiesen. Aus mikrobiologischer Sicht sollte die gebrauchsfertige Lösung sofort verwendet werden, es sei denn, die Methode des Öffnens / der Rekonstitution / des Verdünnens schließt das Risiko einer mikrobiellen Kontamination aus. Wenn die gebrauchsfertige Lösung nicht sofort verwendet wird, ist der Anwender für die Dauer und die Bedingungen der Aufbewahrung verantwortlich, die nicht länger als der oben genannte Zeitraum für die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen Lösung sein sollten.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser <oder Haushaltsabfall>. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**Was Ceftazidim Viatris enthält**

Der Wirkstoff ist Ceftazidim. Jede Durchstechflasche enthält 2 g Ceftazidim (als Ceftazidim Pentahydrat).
- Der einzige sonstige Bestandteil ist Natriumcarbonat.

- Siehe Abschnitt 2 für weitere wichtige Informationen über Natrium, einen der Bestandteile von Ceftazidim Viatris.

**Wie Ceftazidim Viatris aussieht und Inhalt der Packung**

Ceftazidim Viatris ist ein weißes oder blassgelbes Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung, das in einer 50-ml-Durchstechflasche aus Glas mit Bromobutyl-Gummistopfen (Typ I) und grüner Aluminiumkappe zum Abreißen verpackt ist.

Packungsgröße: 10 Durchstechflaschen

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Viatris Germany GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

Mitvertrieb:
Viatris Healthcare GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

**Hersteller**
Viatris Santé
1 Rue De Turin
69007 Lyon
Frankreich

oder

Quinta-Analytica s.r.o.
Prazska 1486/18c, Hostivar
102 00 Prag
Tschechische Republik

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

**Deutschland:** Ceftazidim Viatris 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

**Malta:** Ceftazidime DALI Pharma 2 g Powder for Solution for Injection/Infusion

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2026.**

---

**Die folgenden Informationen sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt:**

Für die vollständige Verschreibungsinformation beachten Sie bitte die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Die Ceftazidim-Durchstechflaschen werden mit reduziertem Druck bereitgestellt. Wenn das Pulver aufgelöst wird, wird Kohlendioxid freigesetzt und es kommt zu einem Druckanstieg. Kleine Blasen Kohlendioxid in der rekonstituierten Lösung können ignoriert werden.

Hinweis zur Rekonstution
Siehe Tabelle 1 und 2 über zuzufügende Volumina und entsprechende Konzentrationen der Lösung. Dies kann bei Bedarf von Teildosen hilfreich sein.

Tabelle 1: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

| Gebinde | Zuzufügende Menge an Lösungsmittel (ml) | | Ungefähre Konzentration (mg/ml) |
|---|---|---|---|
| 2 g | | | |
| | Intravenöse Bolusgabe | 10 ml | 174 |

Hinweis:
• Das resultierende Endvolumen der Ceftazidim Viatris-Lösung im Rekonstitutionsmedium ist aufgrund des Verdrängungsfaktors des Arzneimittels erhöht und führt zu den in der obigen Tabelle angeführten Konzentrationen in mg/ml.

Tabelle 2: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

| Gebinde | Zuzufügende Menge an Lösungsmittel (ml) | | Ungefähre Konzentration (mg/ml) |
|---|---|---|---|
| 2 g | | | |
| | Intravenöse Infusion | 50 ml * | 39 |

* Die Zugabe des Lösungsmittels erfolgt in zwei Schritten

Hinweis:
• Das resultierende Endvolumen der Ceftazidim Viatris-Lösung im Rekonstitutionsmedium ist aufgrund des Verdrängungsfaktors des Arzneimittels erhöht und führt zu den in der obigen Tabelle angeführten Konzentrationen in mg/ml.

Die Lösung variiert in der Farbe von hellgelb bis bernsteinfarben, abhängig von der Konzentration, dem Lösungsmittel (Verdünnungsmittel) und den Lagerbedingungen. Bei Beachtung der gegebenen Empfehlungen haben diese Farbunterschiede keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Ceftazidim Viatris-Konzentrationen zwischen 1 mg/ml und 40 mg/ml sind kompatibel mit folgenden Injektionslösungen:

- Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)
- Dextrose 50 mg/ml (5%)
- Dextrose 100 mg/ml (10%)
- Dextrose 50 mg/ml (5 %) und Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)
- Dextrose 50 mg/ml (5 %) und Natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45 %)
- Dextrose 50 mg/ml (5 %) und Natriumchlorid 2,25 mg/ml (0,225 %)
- Dextrose 40 mg/ml (4 %) und Natriumchlorid 1,8 mg/ml (0,18 %)
- Natrium-Laktat (Hartmann-Lösung)

Ceftazidim Viatris-Konzentrationen zwischen 0,05 mg/ml und 0,25 mg/ml sind mit Intra-peritonealen Dialyseflüssigkeiten (Laktate) kompatibel.

<u>Herstellung einer Lösung für die Bolus-Injektion</u>

1. Stecken Sie die Spritzennadel durch den Verschluss der Durchstechflasche und spritzen Sie die zur Verdünnung empfohlene Menge an Lösung hinein. Das Vakuum kann den Eintritt der Verdünnungslösung unterstützen. Entfernen Sie die Spritzennadel.
2. Zum Auflösen schütteln: Kohlendioxid wird freigesetzt und man erhält eine klare Lösung in etwa 1 bis 2 Minuten.
3. Drehen Sie die Durchstechflasche um. Stecken Sie die Nadel mit komplett gedrücktem Spritzenstößel durch den Verschluss der Durchstechflasche und ziehen Sie das komplette Volumen der Lösung in die Spritze auf (der Druck in der Durchstechflasche kann beim Aufziehen helfen). Stellen Sie sicher, dass die Nadel in der Lösung bleibt und nicht in den Kopfraum eintritt. Die entnommene Lösung kann kleine Blasen Kohlendioxid enthalten; diese können vernachlässigt werden.

Diese Lösungen können direkt in die Vene gegeben werden, oder in den Schlauch des Infusionsbestecks, wenn der Patient parenterale Flüssigkeiten erhält. Ceftazidim Viatris ist mit den oben aufgelisteten intravenösen Lösungen kompatibel.

Zubereitung einer intravenösen Infusionslösung aus einer Standard-Durchstechflasche von Ceftazidim Viatris (Minibeutel oder Bürette-Typ-Infusionsset):

Bereiten Sie (für eine 2 g Durchstechflasche) insgesamt 50 ml kompatibles Lösungsmittel zu und fügen Sie es in ZWEI Schritten hinzu, wie nachstehend beschrieben:

1. Stecken Sie die Spritzennadel durch den Verschluss der Durchstechflasche und spritzen Sie 10 ml Verdünnungslösung für die 2 g Durchstechflaschen hinein.
2. Ziehen Sie die Spritzennadel heraus und schütteln Sie die Durchstechflasche, bis die Lösung klar ist.
3. Führen Sie keine Druckausgleichsnadel ein, bis sich das Arzneimittel aufgelöst hat. Stechen Sie die Druckausgleichsnadel durch den Verschluss der Durchstechflasche, damit der Innendruck entweichen kann.
4. Übertragen Sie die rekonstituierte Lösung in das endgültige Verabreichungssystem (z. B. Minibeutel oder Bürette-Typ-Set), was ein Gesamtvolumen von mindestens 50 ml ergeben sollte, und verabreichen Sie diese als intravenöse Infusion über 15–30 Minuten.

HINWEIS: Um die Sterilität des Arzneimittels zu erhalten, ist es wichtig, dass die Druckausgleichsnadel nicht durch den Verschluss der Durchstechflasche gesteckt wird, bevor sich das Arzneimittel vollständig zu einer klaren Lösung gelöst hat.
Das Arzneimittel muss nach der Verdünnung visuell kontrolliert werden, bevor es angewendet werden darf. Es dürfen nur klare Lösungen ohne sichtbare Partikel verwendet werden.

Jegliche Reste der Antibiotika-Lösung sollen verworfen werden.

Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.