

Gebrauchsinformation

Oleum Zinci oxidati SR

50 % ige Suspension zur Anwendung auf der Haut

Dermatikum

Wirkstoff: Zinkoxid

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protectiv und sekretbindend bei akuten und subkutanen Dermatosen (Hautkrankheiten).

Gegenanzeigen

Oleum Zinci oxidati SR darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Zink, Erdnuss oder Soja sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Großflächige Anwendung auf Hautarealen von mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, können Sie Oleum Zinci oxidati SR bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Doch sollte eine großflächige Anwendung, insbesondere an der Brust bei stillenden Frauen, vermieden werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxid-haltige Rückstände von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da die Wirkung anderer Dermatika beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch umschütteln.

Mehrmals täglich, bei Säuglingen zu jedem Windelwechsel, auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Besonders im Kindesalter sind bei versehentlicher Einnahme Übelkeit, Erbrechen, Gastritis und Fieber möglich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Nach Auftragen von Oleum Zinci oxidati SR auf stark entzündliche Hautstellen kann ein leichtes Brennen auftreten.

Gelegentlich (1-10 von 1000) können Hautrötungen, Spannungsgefühl, Austrocknungserscheinungen und raue Haut auftreten.

Erdnussöl kann selten (1-10 von 10 000) schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat soll nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Stets im Originalbehältnis aufbewahren und nicht über 25 °C lagern!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung

100 g Suspension enthalten:

Wirkstoff: Zinkoxid 50,0 g

Sonstiger Bestandteil: Erdnussöl

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 100 g (N2) bzw. 200 g (N3) Suspension.

Pharmaz. Unternehmer/Hersteller

Pharmachem GmbH & Co. KG

Naßäckerstraße 37-39

07381 Pößneck

Tel. 036738 / 659272

Fax 036738 / 659274

Stand der Information

Dezember 2014

100 g (N2)

<200 g (N3)>

Ch.-B.: <>

Verwendbar bis: <>

Apothekenpflichtig! Vor Gebrauch umschütteln!

Zul.-Nr.: 3004451.00.00

<PZN>